

Elite CalPropy

Dietetic feed for dairy cows to reduce the risk of Milk fever and subclinical hypocalcaemia. Cows with a risk of calcium imbalance need fast acting calcium in connection with calving. At the beginning of lactation, extra energy is also consumed, whereby the blood sugar drops. This drop in blood sugar can be prevented with propylene glucol. Elite CalPropy has combined fast acting calcium and a high content of propylene glycol.

Dætetisk fodertilskud til malkekøer til mindskelse af risikoen for mælkfeber og hypocalcæmi. Kør med risiko for calcium ubalance har brug for hurtigtvirkende calcium i forbindelse med kælvning. I starten af laktationen forbruges også ekstra energi, hvorved blodsukkeret falder. Dette fald i blodsukkeret kan forebygges med propylenglykol. Elite CalPropy har kombineret hurtigtvirkende calcium og et højt indhold af propylenglykol.

Kompletteringsfoderblanding för mjölkkor – dietfoder för minskning av risken för kalvningsförlamning. Kor som är känsliga för kalciumpabalans behöver i samband med kalvningen förebyggande och snabbt absorberande kalcium. Starten av mjölkproduktionen förtär också på energiförändret och blodsockernivån sjunker. Denna sänkning kan förebyggas med propylenglykol. I Elite CalPropy har man förenat snabbt absorberande kalcium och ett högt innehåll av propylenglykol.

Composition:

Calcium chloride, propylene glycol, water, magnesium chloride, premix, sodium chloride.

Analytical constituents:

Water	30 %
Ash	32 %
Calcium	11 %
Magnesium	0.4 %
Sodium	0.1 %

Nutritional additives:

Vitamin B1 3a821	170 mg/kg
Vitamin B2 3a826	130 mg/kg
Vitamin B6 3a831	135 mg/kg
D-panthenol 3a842	160 mg/kg

Instructions for use:

The dosing is done with a separate dosing gun. The tip of the gun is placed along the upper surface of the tongue facing the throat and as far as possible. Dosing should be done slowly in appropriate portions as the animals swallow. NOTE! Do not give to paralyzed cow. The product must be shaken. It is recommended that a nutritional expert's opinion be sought before use.

Dosage:

Cows: Dose 300-380 ml one day before the expected calving or at the first signs of calving. Continue dosing at 12 hour intervals and, if necessary, for 2 days. 1 dose 380 ml contains 50 g of calcium.

Sammensætning:

Calciumchlorid, propylenglykol, vand, magnesiumchlorid, premix, natrium-chlorid.

Analytiske bestanddele:

Vand	30 %
Råaske	32 %
Calcium	11 %
Magnesium	0,4 %
Natrium	0,1 %

Tilsætningsstoffer:

Vitamin B1 3a821	170 mg/kg
Vitamin B2 3a826	130 mg/kg
Vitamin B6 3a831	135 mg/kg
D-panthenol 3a842	160 mg/kg

Brugsanvisning:

Produktet gives i munden med en doseringspistol. Spidsen af pistolen skal placeres i siden af munden og bagerst på tungen. Dosering skal udføres langsomt i passende portioner, som dyrene kan synke. OBS! Må ikke gives til dyr uden synkerefleks. Produktet bør omrystes inden brug. Anbefalet brugsperiode: Fra 3 uger før kælvning frem til kælvning. Det anbefales at konsultere en ernæringsekspert før brug.

Dosering:

Kør: 300-380 ml indgives en dag før den forventede kælvning eller ved de første tegn på kælvning. Fortsæt doseringen med 12 timers intervaller og om nødvendigt i 2 dage. 1 dosis 380 ml indeholder 50 g calcium.

Sammansättning:

Kalciumpotassium, propylenglykol, vatten, magnesiumklorid, premix, natriumklorid.

Analytiska beståndsdelar:

Fuktighet	30 %
Aska	32 %
Kalcium	11 %
Magnesium	0,4 %
Natrium	0,1 %

Fodertillsatser: Näringstillsatser:

B1 -vitamin 3a821	170 mg/kg
B2 -vitamin 3a826	130 mg/kg
B6-vitamin 3a831	135 mg/kg
D-pantenol 3a842	160 mg/kg

Bruksanvisning:

Doseringen sker med en doseringspistol. Pistolen spets placeras längs med tungans övre yta riktad mot svalget och så långt som möjligt. Doseringen bör ske långsamt i lämpliga portioner i takt med att djuret sväljer. OBS! Får inte ges till djur utan sväljreflex. Produkten bör omskakas före användning. Det rekommenderas att en näringsexpert tillfrågas före användning.

Dosering:

Kor: Dosera 300-380 ml ett dygn före den beräk-nade kalvningen eller vid de första tecknen på kalvning. Fortsätt med doseringen med 12 timmars mellanrum och vid behov i 2 dygns tid. 1 dos 380 ml innehåller 50 g kalcium.



5 L

Vilofarm
Tel. +45 88 87 53 00