



Hivetona Plus Liquid 1200 kg

Fodertilskud til malkekøer og kvier

Propylenglykolholdig energiblanding til højtydende malkekøer. Massefylde 1,2 kg/l.

SAMMENSÆTNING: Propylenglykol, melleasse af EU-oprindelse, polyolblanding, vand og glycerol.

TILSÆTNINGSSTOFFER:

3a890 Cholin Chlorid 3000 mg/kg
3a315 Niacinamid 1500 mg/kg

ANALYTISKE BESTANDDELE:

Vand 26 %, Råprotein 3,0 %, Råfedt 0,0 %, Råfiber 0,0 %, Råaske 2,2 %, Natrium 2,8 g/kg, Energi indhold 17,9 MJ/kg ts, Xylitol 7,4 %.
Non GMO.

BRUGSANVISNING OG DOSERING:

Anvendes 2 uger før kælvning og fortsættes i 5 uger efter kælvning.

Malkekøer og kvier: 0,2 l/dag før kælvning, 0,3 l/dag efter kælvning. Ved behov kan dosering fordobles.

Får: 0,5 dl/dag 2 uger før og 3 uger efter læmning.

Partinummer/Lot nr.:

Minst holdbar til/Best before:

Holdbarhed 24 måneder/Hållbarhet 24 månader/Sheff time 24 month.

VILOFARM A/S

Søagervej 9 · Onsild

DK-9500 Hobro

ordre@vilofarm.dk

Kompletteringsfoderblanding for mjølkkor og kviger

Propylenglykol indeholdende energiløsning for højavkastende kor. Volymvikt 1,2 kg/l.

SAMMENSÆTNING: Propylenglykol, blandmelass af EU-ursprung, polyolblanding, vatten och glycerol.

TILLSÄTTSÄMMEN:

3a890 Kolinklorid 3000 mg/kg
3a315 Niacinamid 1500 mg/kg

ANALYTISKA BESTÄNSDELAR:

Fuktighet 26 %, Råprotein 3,0 %, Råfedt 0,0 %, Växtråd 0,0 %, Aska 2,2 % Natrium 2,8 g/kg, Energivärde 17,9 MJ/kg ts, Xylitol 7,4 %.
Non GMO.

BRUGSANVISNING OCH DOSERING:

Används 2 veckor före kalvningen och fortsättes i 5 veckors tid efter kalvningen.

Mjølkkor och kviger: Före kalvningen 0,2 l/dag delat i två doser. Efter kalvningen 0,3 l/dag delat i två doser. Vid behov kan dosen fördubblas.

Får: Används 2 veckor före lamningen och fortsättes till betessläpp eller i 3 veckors tid efter lamningen. Dosering 0,5 dl/dag.

Feed Supplement for Dairy Cows and Heifers

A energy blend containing propylene glycol for highyield dairy cows. Density: 1.2 kg/l.

COMPOSITION: Propylene glycol, molasses of EU origin, polyol blend, water, and glycerol.

ADDITIVES:

3a890 Cholin Chlorid 3000 mg/kg
3a315 Niacinamide 1500 mg/kg

ANALYTICAL CONSTITUENTS:

Water 26 %, Crude Protein 3.0 %, Crude Fat 0.0 %, Crude Fiber 0.0 %, Crude Ash 2.2 %, Sodium 2.8 g/kg, Energy Content 17.9 MJ/kg DM, Xylitol 7.4 %. Non-GMO.

INSTRUCTIONS FOR USE AND DOSAGE:

For use 2 weeks before calving and continue for 5 weeks after calving.

Dairy Cows and Heifers: 0.2 l/day before calving, 0.3 l/day after calving. If needed, the dosage can be doubled.

Sheep: 0.5 dl/day 2 weeks before and 3 weeks after lambing.

Opbevares i lukket emballage, beskyttet mod sollys. Lagring i en sluten förpackning, skyddad från solljus. Stored in a closed container, protected from sunlight.



6 417586 853540 >

Vilofarm

Tel. +45 8887 5300

cf1Z1110001