

# LiqVita<sup>®</sup> ADEK

Art.no.: 37180

5L

Diætetisk foder til at understøtte forberedelse til brunst og reproduktion /  
Dietetic feed to support the preparation for oestrus and reproduction

## DK LIQVITA ADEK

### Næringsstoffer:

Vandindhold	79 %
Råprotein	0 %
Råfedt	18 %
Træstof/råfiber	0 %
Aske	0,46 %
Natrium	1,45 g/kg

### Tilsætningsstoffer: Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer:

Vitamin A 3a672b	4500000 ie/kg
Vitamin D3 3a671	1000000 ie/kg
E-vitamin (all-rac-alfatokoferol acetat) 3a700	25000 mg/kg
Vitamin K3 3a711	2000 mg/kg
Niacin 3b315	5000 mg/kg
Selen 3b801 natriumselenit	25 mg/kg

**Sammensætning:** Vand, xylitol, dinatriumfosfat.

**Holdbarhed:** 18 måneder.

**Opbevaring:** Opbevares køligt (under +18° C), i lukket emballage og beskyttet mod sollys. Må ikke nedfryses.

Reg.nr. 280-R756056.

**Fremstillet af:** αFI21110001.

**Brugsvejledning:** Dosering (per dag):

Søer/1000 kg flydende foder (dm 28 %)	120-200 ml
Søer/1000 kg foder (dm 88 %)	400-700 ml
Daglig dosis til søer	3-5 ml
Kvæg/1000 kg TMR (dm 45 %)	70-200 ml
Malkekøer/dag	3-9 ml
Kødkvæg/dag	2-4 ml
Ungt kvæg/dag	2 ml
Heste/dag	2-3 ml

Søer: 7 dage før og 3 dage efter faring samt 7 dage

før indtil 3 dage efter parring. Køer: 2 uger før drægtighedsafslutning, indtil den næste drægtighed er konstateret.

Heste: Fra den sidste del af drægtigheden, indtil den næste drægtighed er bekræftet.

Hanpattedyr: Perioder med reproduktiv aktivitet.

## GB LIQVITA ADEK

### Nutrients:

Moisture	79 %
Crude protein	0 %
Crude fat	18 %
Crude fiber	0 %
Ash	0,46 %
Sodium	1,45 g/kg

### Feed additives: Nutritional additives:

Vitamin A 3a672b	4500000 ie/kg
Vitamin D3 3a671	1000000 ie/kg
E-vitamin (all-rac-alfatokoferol acetat) 3a700	25000 mg/kg
Vitamin K3 3a711	2000 mg/kg
Niacin 3b315	5000 mg/kg
Selen 3b801 natriumselenit	25 mg/kg

**Composition:** Water, xylitol, disodium phosphate.

**Shelf life:** 18 months.

**Storage:** Store in closed package in cool conditions (under +18° C), protected from sun light. Do not freeze.

Reg.nr. 280-R756056.

**Manufactured of:** αFI21110001.

**Instructions for use:** Dosage (Per day):

Sows/1000 kg liquid feed (dm 28 %)	120-200 ml
Sows/1000 kg feed (dm 88 %)	400-700 ml
Sows daily dosage	3-5 ml
Cattle/1000 kg TMR (dm 45 %)	70-200 ml
Dairy cow/day	3-9 ml
Beef cattle/day	2-4 ml
Young cattle/day	2 ml
Horses/day	2-3 ml

Sows: 7 days before and 3 days after parturition and 7 days

before until 3 days after mating. Cows: 2 weeks before the end of gestation until the next gestation is confirmed.

Horses: from the last part of the gestation until the next gestation is confirmed.

Males: during periods of reproductive activity.



5 712857 048023

**Vilofarm**

+45 8887 5300