

Zyklène® - quickguide til anvendelse

Enkeltpåvirkninger

Giv Zyklène ca 1 time før forventet påvirkning.

Eksempler:

- Dyrlægebesøg
- Kloklip
- Trimning
- Transport i f.eks. bil eller tog
- Børnefødselsdag/fester
- Lydfølsomhed hos jagthunde
- Gæster, hvis katten er sky

Kortere påvirkninger

Giv Zyklène 1 x daglig i den periode, påvirkningen står på.

Hvis påvirkningen er størst i dagtimerne, gives Zyklène om morgenen. Er påvirkningen størst om aftenen/natten, gives Zyklène først på aftenen.

Eksempler:

- Pensionsophold
- Spontan ubehag efter traumatisk oplevelse
- Flytning
- Introduktion af nye dyr i hjemmet
- Ankomst af baby i hjemmet
- Ombygning/ommøblering af hjemmet
- Ændret døgnrytme i hjemmet - f.eks. nye arbejdstider

Længerevarende påvirkninger

Bør kombineres med adfærdsregulerende træning enten via en dyreklinik eller en anden adfærdskompetent person.

Zyklène kan anvendes gennem en længere periode.

Hvis påvirkningen er størst i dagtimerne, gives Zyklène om morgenen. Er påvirkningen størst om aftenen/natten, gives Zyklène først på aftenen.

Enkelte hunde/katte kan have glæde af, at normaldosis gives 2 x daglig.

Eksempler:

- Alene hjemme problemer
- Utryghed overfor fremmede
- Utryghed overfor trafik
- Urenlighed hos kat
- Utryghed overfor andre hunde
- Lydfølsomhed hos hunde og katte
- Generel utryghed